

Doramec® L.A.



100 mL

Animales mayores

Doramec® L.A.

Solución Inyectable
Antiparasitario Interno y Externo -
Endectocida de Acción Prolongada

Uso Exclusivo Veterinario

Doramectina 1 g, excipientes c.s.p. 100 mL

INDICACIONES: Tratamiento y control de parasitosis internas (gastrointestinales y pulmonares) y externas (miasis/larvas de moscas, garrapatas, sarna, piojos). Incluye: *Haemonchus* spp., *Ostertagia* spp., *Nematodirus* spp., *Trichostrongylus* spp., *Dictyocaulus* spp., *Boophilus microplus*, *Dermatobia hominis*, *Psoroptes* spp., entre otros. Su vehículo le confiere una lenta liberación y larga acción (45 días). Las concentraciones plasmáticas de doramectina se mantienen altas por más tiempo que la ivermectina.

Información adicional en el inserto adjunto.

M.V. Resp. Emp. Titular: Umberto Calderón O. CMVP 2944



100 mL

Animales mayores

Doramec® L.A.

Solución Inyectable
Antiparasitario Interno y Externo -
Endectocida de Acción Prolongada

Uso Exclusivo Veterinario

Reg. SENASA Perú: F.09.01.N.0141
Costa Rica: Reg. MAG PE2-42-41-3743
Reg. Ecuador: 3A1-3B3-10451-AGROCALIDAD
Reg. El Salvador: 2007-12-3694
Reg. Guatemala: 19-29-188-10980
Reg. Honduras: PF: 3883
Reg. Panamá: RF-3307-05
Reg. Paraguay: 10.681
Reg. Rep. Dominicana: 5989
Reg. Venezuela: MAT SASA M.I. 12.873
RIF: J-30591171-1

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía subcutánea o intramuscular. Bovinos, ovinos, caprinos y camélidos: 1 mL/50 kg; porcinos: 1 mL/33 kg.
PERIODO DE RETIRO: Carne: 50 días.
PRECAUCIONES: No usar en bovinos en lactación ni 50 días antes del parto. Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar. Almacenar entre 8°C y 30°C. Mantener alejado del alcance de los niños.

Fabricado en el Perú para Agrovvet Market S.A.



Doramec® es una marca registrada de Agrovvet Market S.A.

V4.151210
03433

Doramec® L.A.