



Animales mayores

100 mL

Doramectina 1 g, excipientes c.s.p. 100 mL

Doramec® L.A.

DOSIS Y ADMINISTRACIÓN: Vía subcutánea o intramuscular. Bovinos, ovinos, caprinos y camélidos: 1 mL/50 kg; porcinos: 1 mL/33 kg.

PERIODO DE RETIRO: Carne: 50 días.

PRECAUCIONES: No usar en bovinos en lactación ni 50 días antes del parto. Conservar en un lugar fresco y seco, protegido de la luz solar. Almacenar entre 8°C y 30°C. Mantener alejado del alcance de los niños.

Solución Inyectable de Acción Prolongada - Uso Veterinario

INDICACIONES: Tratamiento y control de parasitosis internas (gastrointestinales y pulmonares) y externas (miasis/larvas de moscas, garrapatas, sarna, piojos). Incluye: *Haemonchus* spp., *Ostertagia* spp., *Nematodirus* spp., *Trichostrongylus* spp., *Dictyocaulus* spp., *Boophilus microplus*, *Dermatobia*, *Psoroptes* spp., entre otros. Su vehículo le confiere una lenta liberación y larga acción (45 días). Las concentraciones plasmáticas de doramectina se mantienen altas por más tiempo que la ivermectina. Información adicional en el inserto adjunto.

Fabricado en el Perú para Agrovvet Market S.A.



agrovvetmarket
animalhealth

M.V. Resp. Emp. Titular: Umberto Calderón O. CMVP 2944.
Reg. SENASA Perú: F.09.01.N.0141; Costa Rica: Reg. MAG
PE2-42-41-3743; Reg. Ecuador: 3A1-3B3-10451-
AGROCALIDAD; Reg. Guatemala: 19-29-188-10980; Reg.
Honduras: PF-3883; Reg. Panamá: RF-3307-05; Reg.
Paraguay: 10.681; Reg. Rep. Dominicana: 5989; Reg.
Venezuela: MATSASA M.I. 12.873 RIF: J-30591171-1